

褥瘡だより 第44号

2024.3月発行



～新規購入薬品の紹介～

イソジンシュガーパスタ軟膏（100g／チューブ）

成分、メーカー、薬価	適応症、用法・用量	作用
<p>1 g 中 〔精製白糖 700mg ポビドンヨード 30mg〕</p> <p>ヨウ素過敏症がある人に注意</p> <p>ムンディファーマ(株)</p> <p>8.50円／g</p> 	<p>褥瘡、 皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍)</p> <p>症状及び病巣の広さに応じて適量を使用する。</p> <p>創を乾燥させすぎないように注意</p>	<p>—主薬(薬効成分)—</p> <p>●ポビドンヨードによる殺菌作用と、精製白糖による創傷治癒作用を併せ持つ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポビドンヨードは、細菌・真菌・ウイルスなどに幅広い殺菌作用を有している。 ・精製白糖は、吸水性に優れ、滲出液を吸収して局所の浮腫を軽減することにより肉芽形成を促進させる。 <p>—基剤—</p> <p>●マクロゴールによる吸水作用</p>



こんな場合に適しています

ステージⅢ～Ⅴの
 黒色期～黄色期の創に対して

- ・ 滲出液が多い場合
- ・ 感染・炎症を伴う場合



ちょっと一息…

「イソジンシュガーパスタ軟膏」の
 ・シュガー・は白糖のこと、
 ・パスタ・はパスタ剤のことです。
 パスタ剤(泥膏ともいう)とは、軟膏基剤に粉末剤が練り合わさり、軟膏よりも粘度の高い外用薬のこと。ただし、日本薬局方には、「パスタ剤」という剤形の定義はなく『軟膏剤』に含まれます。

コラージュフルフルによる褥瘡の洗浄方法



創周囲皮膚を優しく泡で洗います。



38℃程度の微温湯を、創周囲洗浄用のボトル容器に入れ、水流で洗い流します。



創内は、生理食塩水または、滅菌蒸留水、水道水のいずれかを使用し、水圧のみで洗浄します。



創面と創周囲皮膚の水分をガーゼなどで拭き取ります。創面や創周囲皮膚の損傷を避けるため、ガーゼは動かさず押さえ拭きします。



抗真菌(抗カビ)成分と殺菌成分をダブルで配合

バイオフィルム(細菌の集合体)を取り除き、治癒を促進しよう!!